High Alert Drug

Digoxin injection

Notify if : **1.** HR < 60 ครั้ง/ นาที

2. มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เห็นภาพเป็นสีเขียวเหลือง

3. K^+ < 3.5 mEq/L

ติดตาม HR ทุก 15 นาที 2 ครั้ง, ทุก 30 นาที 2 ครั้ง และ ทุก 1 ชั่วโมง 2 ครั้ง

ติดตาม EKG ขณะฉีดยาและหลังฉีดยา 1 ชั่วโมง

ติดตามค่า K^+ ในเลือดสัปดาห์ละครั้ง

วันที่	เวลา	HR (ครั้ง/นาที)	EKG (Monitor แล้วทำเครื่องหมาย ✓)	K^+ (mEq/L)	Notify และการแก้ไข	ลงชื่อ พยาบาล
Baseline						

<u>แนวทางการเตรียมและบริหารยา</u>

1. ตรวจสอบยาก่อนเตรียม คำนวณยา และการผสมยา โดยพยาบาล 2 คน

2. การให้ยาทาง IV เจือจางด้วย SWFI, NSS หรือ D5W อย่างน้อย 4 เท่า

3. ไม่ผสม digoxin กับยาอื่น

4. ดูระดับ K^+ ก่อนให้ยา ถ้า < 3.5 mEq/L ต้องแจ้งแพทย์เพื่อยืนยันคำสั่งใช้ยา

5. การให้ยาทาง IV ต้องฉีดช้าๆ ใช้เวลา ≥ 5 นาที

ชื่อ-นามสกุล_____HN_____วันที่_____